

患者用药说明书

[PIOGLITAZONE]

药物的疗效？

PIOGLITAZONE 用于控制糖尿病，它可提高您的身体对胰岛素的反应速度和敏感度，从而帮助您降低血糖。胰岛素有助于控制您体内的血糖。服药的同时还需要改变生活方式，如维持健康饮食习惯，定期做运动，才能发挥降低血糖的预期作用。

我应该如何服药/用药？

每天服用一次。您可以在饭前或饭后服药。

如果我忘了服药/用药，我应该怎么做？

如果您错过服药，在想起来的时候尽快服用。如果已接近下一次服药的时间，您只需照常服用原定的剂量。

请别为了补回错过的剂量，而将下一次的剂量加倍或服用过量药片。

服药/用药必须注意哪些事项？

如果您有以下情况或习惯，请通知您的医生：

- 对这种药物或药物所含有的某种成分过敏
- 怀着孕、计划怀孕或正在哺乳
- 患有心力衰竭（一种心脏不能正常泵血的情况）
- 体内有液体积聚
- 患有一种与糖尿病相关的眼科疾病，称为黄斑水肿（由于液体积聚于眼睛的黄斑区而出现肿胀的情况）
- 有任何肝脏问题
- 有膀胱癌的病史
- 有骨折的病史

这种药物有哪些常见的副作用？

就如服用任何药物，这种药物可能会引起一些副作用，但并非所有人都会出现副作用。如果副作用变得严重以致影响您生活，请看医生。

Pioglitazone 的常见副作用包括：

- 腿部水肿

- 头痛
- 鼻窦炎和呼吸道受感染
- 喉咙痛
- 体重增加
 - 请定期做运动以避免服药后体重增加

出现哪些罕见但严重的副作用时，我必须立即求医？

药物过敏有以下一项或多项症状：

- 脸部/眼睛/嘴唇/舌头肿胀
- 呼吸困难
- 全身发痒、出现皮疹

如果您出现以上任何症状，您应该停止用药并立即去看医生。

如果发生以下严重的副作用，也应该立即去看医生：

- 膀胱癌的症状包括：
 - 尿中带血
 - 排尿时疼痛
 - 膀胱控制能力差
 - 感觉自己需要更频繁地排尿
- 心脏衰竭或觉得您的症状恶化。心脏衰竭恶化的症状包括：
 - 呼吸急促
 - 体重突然快速增加
 - 腿部过度水肿
- 肝脏问题：尿液颜色变深或粪便颜色变浅、眼睛或皮肤发黄、严重食欲不振，胃痛，恶心或呕吐不止。
- 黄斑水肿（由于液体积聚于眼睛的黄斑区而出现肿胀的情况）。黄斑水肿的症状：
 - 视力模糊
 - 视力改变

服药/用药时，有哪些食物或药物是我应该忌口的？

避免在服药时喝酒，因为这可能提高低血糖风险。

我应该如何存放这种药物？

把药物存放在阴凉和干燥的环境中，避免让阳光直接照射在药物上。请存放在儿童不易触及之

处。

我应该如何安全地扔弃这种药物？

请将此药装入黑色垃圾袋并密封好，然后一并扔进垃圾槽或垃圾桶。

免责声明

请注意，以上并非完整的副作用列表。如果您对药物有任何担忧，或者您认为该药物有引起其他副作用，请咨询您的医生或药剂师。

如果您服用的剂量超出了所建议的剂量，请立即求医。本说明书所提供的信息并不能取代您医生提供的建议。更多信息，请咨询您的医疗护理人员。

本文由全国药物信息工作小组成员共同编写，并获得卫生部的支持。工作小组由三大医疗集群（国立健保集团、新加坡国立大学医学组织、新保健集团）、社区药房（佳宁、职总仁益、屈臣氏药房）以及新加坡药剂学会的代表组成。说明书内容并不反映药房和医疗机构的药品供应和供给信息。想了解这方面信息，请向相关医疗机构查询。